




DISSERTATIO MEDICA,

INAUGURALIS,

DE

MORBIS CUTANEIS.



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1000 UNIVERSITY AVENUE

CHICAGO

1900 UNIVERSITY AVENUE

CHICAGO, ILL.

DISSERTATIO MEDICA,  
I N A U G U R A L I S,  
D E  
M O R B I S C U T A N E I S.

Q U A M,  
A N N U E N T E S U M M O N U M I N E,  
Ex Auctoritate Reverendi admodum Viri,  
D. GULIELMI ROBERTSON, S. S. T. P.  
A C A D E M I Æ E D I N B U R G E N Æ P R Æ F E C T I ;

N E C N O N  
Amplissimi SENATUS ACADEMICI consensu,  
Et nobilissimae FACULTATIS MEDICÆ decreto;  
P R O G R A D U D O C T O R A T U S ,  
S U M M I S Q U E I N M E D I C I N A H O N O R I B U S E T P R I V I L E G I I S  
R I T E E T L E G I T I M E C O N S E Q U E N D I S ;  
Eruditorum examini subjicit

J O A N N E S A S T B U R Y ,  
A N G L U S ,

Soc. Reg. Med. Edin. Sod.

Ad diem 25. Junii, hora locoque solitis.

E D I N B U R G I :  
Apud BALFOUR et SMELLIE,  
Academiae Typographos.

M,DCC,LXXXI.

287C

Reverendo Viro,

GULIELMO ROBINSON, A. M.

DE LITCHFIELD,

IN COMITATU STAFFORDIÆ,

Ob proprias virtutes,

Ingenii solertiam,

Morum elegantiam,

Insigni;

Hasce studiorum primitias

Sacras esse voluit]

JOANNES ASTBURY.

Mr Lister

from his friend

J Astbury —

DISSERTATIO MEDICA,

I N A U G U R A L I S,

D E

MORBIS CUTANEIS.

**D**E re medica scripturo, nullum thema neque dignius neque utilius, quam de quibusdam cutis morbis, differere visum est; nam de omnibus tractare nec vires nec otium sufficiunt. Hujus igitur academiae legibus morem gerens, pauca de lepra, herpete, et psora, in medium proferam.

Prius

Prius tamen, quam ad hos morbos tractandos aggrediar, haud inutile erit de acrimonia quaedam praefari. Opinio inter medicos diu obtinuerat, omnes cutis morbos ex acrimonia quadam in sanguine existente oriri; et hanc acrimoniam e sanguine ad partem affectam devehī. Rem tamen in multis casibus longe aliter sese habere manifestum est; plurimae enim materiae species, simul ac in ventriculum accipiuntur, efflorescentias in cutem pariunt, quae, quum primum ex ventriculo ejiciuntur, illico evanescunt. Pisces varii, salmo, halec, musculus, et alia, scilicet, amygdalae \*, farina avenacea †, oculi cancrorum, in quibusdam hominibus hunc effectum edunt. Clarissimus Van Swieten casum, quem ipsi vidisse contigit, his verbis narrat: ‘ Praeterea, docet observatio, quandoque illud, quod pruritus  
‘ et

\* Vid. Clariss. Gregor. Praelect. Clin.

† Vid Dr Withering on Scarlatina Anginosa,



et exanthemata facit, haerere in ventriculo, et circa praecordia ; atque, hoc excusso, statim ista evanescere. Dum mala fortuna venenatum mytulum quis devoravit, summa sequitur, nunc serius nunc citius, anxietas ; et paulo post, cum pruritu summo, tota fere corporis cutis exanthematibus obsidetur ; dato vitriolo albo, vel simili alio emetico, quod illico vomitum facit, dum deglutitum est, si excutiantur contenta ventriculo, evanescunt brevi, una cum anxietate, hae efflorescentiae. Neque credibile videtur, venenatam illam acrimoniam, sanguine mistam, ad cutim delatam fuisse, cum post vomitum illico cessent omnia mala. Novimus hominem, cui illico eadem symptomata contingunt, si lapides cancrorum sumpserit ; cessantia pariter, dum vomitu hos rejecerit.

Hae eruptiones e mutata sanguinis distributione, ejusque in vasis cutis impetu

B

adaucto,

adaucto, pendere videntur. Huic opinioni favet eruptio guttae roseae in temperamentis sanguineis et ad haemorrhagias maxime proclivibus. Nec raro observamus utrumque sexum acmes tempore, id est, circa illam aetatem qua maxime plethora laborant, eruptionibus cutaneis obnoxium esse, quae tamen post paucos annos sponte decedunt \*. Multae observationes docent, fluida acria organis ipsis secretoriis, vasisque, per quae transeunt, gigni, dum alia corporis fluida bene se habeant: Docent coryza et gonorrhoea, et saliva foetida in variolis, vel cum mercurius aut quivis alius stimulus glandulis admoveatur. Denique, omnes fere secretiones, aucto molimine, diu pergentes, acrem speciem induunt, et partes vicinas deglubunt. Docet praeterea puris formatio, quod acrem aut blandam speciem prae se fert, prout vasa se habent. Hinc clare patet, plurimos cutis morbos vel e sanguinis cursu

\* Vid. Dimisdale, Dissertatio Inauguralis.

curfu mutato, aut fecretione vaforum cutis depravata, deducendos effe. Acrimoni-  
am in fanguine nonnunquam locum ha-  
bere, et cutis morbos gignere, non infi-  
ciar. Hoc enim in fyphilitide, in exanthe-  
matibus contagiofis, abforptionis ope to-  
tum fyftema vitiantibus, clare perfpicueque  
patefcit.

Morbus, fub nomine leprae et elephan-  
tiasis, qui apud Egyptios, Graecos, et Ara-  
bos<sup>d</sup>, graffatus eft, idem morbus (ut opinor)  
eft habendus.

In naturis morborum indagandis femper  
eft animadvertendum, corpus humanum, et  
morbos fuos, mirum in modum a regione,  
in qua degatur, affici ; morborum enim  
duratio et fpecies ex calore, frigore, fitu, et  
etiam incolarum moribus, variant. His  
confideratis, ratio nobis patebit, quare in  
quibusdam regionibus hic morbus non ul-  
terius primo ftadio progrediatur, dum in a-

liis omnia percurrit ; verum enim est, si nihil illi obstiterit, eundem morbum incipientem leprae, progredientem autem elephantiasis, speciem prae se laturum. Sic dicit Prosper Alpinus : ‘ Impetigo quaedam, quae ut plurimum alas, pectus, inguina, faciem, imo aliquando totum corpus, occupat, idque scabrum et deforme reddit ; si neglecta sit, praesertim in subiectis melancholicis, in lepram Arabum, vel, quod multo pejus est, in ipsissimam elephantiasin transit \*.’

## HISTORIA MORBI.

Incipiens malum nullam habet insignem jacturam. Plerumque in faciem, nonnullis autem in brachia, aut crura, maculae, modo subalbidae, modo subflavae, modo subnigrae, erumpunt. Cutis inaequaliter  
crassa,

\* Vid. Prosper Alpin de Medicina Ægyptiorum, cap. 17.

crassa, squamosa, dura, furfurosisque tuberculis foeda, et fere ita sensu caret, ut acus puncturam aeger vix sentiat \*, (licet proximae partes pruriant.) In hoc statu, morbus nonnunquam per tres quatuorve annos durat, salva adhuc sanitate. Tunc, progrediente morbo, pili pubis et barbae rarefcunt; cutis capitis altis et frequentibus rimis scissa apparet; spiritus difficulter trahitur et male olet. Crassescunt malae, mentum dilatatur, amboque ruborem exhibent, non floridum quidem illum, sed turpiter lividum.

Urina, qualis jumentorum, crassa et turbida est. Nunc vexatur aeger infomniis melancholicis, familiaribus; et quidam etiam sese praefocari inter dormiendum rati, cum impetu expergiscuntur et lecto exiliunt. Plerique venerem maxime appetunt. Impetigines fummos digitos et genua infestant;

\* Joannes, London Medical Observations, vol. 1.  
et Prosper Alpinus.



tant ; oculi caligant ; vox raucescit, et fae-  
pissime ulcus in faucibus conspicitur. Su-  
percilia deorsum prominent ; facies livescit ;  
frons contrahitur, nares cum atris tumo-  
ribus salebrosoe et extentae sunt. Labio-  
rum prominentia crassa est ; aures, admista  
nigritia, rubent, et consueto majores esse  
videntur. Totum denique corpus rugis  
asperis fulcatur, et foede emacrescit ; furae  
et pedes intumescunt, hique ut plurimum  
frigidi torpidique sunt. Pulsus parvus et  
occultus est ; nunc varicosae venae in tibiis  
et in linguae radice cernuntur. Morbo  
inveterascente, eroditur narium media car-  
tilago ; tandem aliquibus partibus corrup-  
ta decidit ; labra etiam inversa sunt ; oculi  
angulum interiorem versus rotundiores, et  
quod in iis album esse solet, flavescit, cras-  
sumque fit, quasi ungue obtectum. Si plus  
augescit malum, tumores in malis, mento,  
digitis, genibusque, ulcerosi fiunt, aliis su-  
per alia ulceribus nascentibus ; tandem na-  
fus,

fus, digiti, manus, genitalia decidunt, et mors sequitur.

## D I A G N O S I S.

A lue venerea dignoscitur cutis specie, magnis squamis foeda desquamandis, vicinarum partium pruritu illam nequaquam comitante.

## CAUSÆ PRÆDISPONENTES.

Habitu delicato praediti, ut mulieres et spadones, hujus morbi fere sunt immunes; homines temperamento melancholico, una cum rigiditate et debilitate quadam vasorum corporis extremorum, praediti, huic morbo maxime sunt obnoxii. In tali habitu, liquorum spirituosorum nimius usus, prava diaeta, venus immodica, animi pathemata

themata violenta, vigilatio, nimia animi applicatio, aggressioni morbi favent.

### CAUSÆ EXCITANTES.

Prosper Alpinus caeterique medici hunc morbum ex cibi errore ducere originem credidere ; nimirum e piscibus lutulentis et falitis, quibus vescebantur, et aqua caenosa quam potabant ; sed, si hoc omnino verum esset, cur non videmus huncce morbum in omnibus urbibus maritimis grassantem, quarum incolae, praecipue pauperiores, piscibus aluntur ? Multo verisimilius mihi videtur, contagionem specificam esse, quae debilitatem et actionem vasorum corporis extremorum depravatam inducit.

### CONSILIA



## CONSILIA MEDENDI

Duo sunt : Primo, rigiditati vasorum extremorum occurrere.

Secundo, actionem eorum excitare.

Ad primum, balneum tepidum et sulphuratum est referendum : Ad alterum mercurii praeparationes et acidum vitriolicum, variis modis usurpatum. Medicamenta interna sunt pil. Plumer. solutio mercurii sublimati, more Swieteniano, solutio tart. emet. decoctio lignorum, et cort. ulmi; jus viperinum, et fonticulos, cum successu se adhibuisse, testatur clariss. Home\*. Oportet abstinere aeger Venere et Baccho, a falsis fumoque induratis et pinguibus, et quotidie probe se exerceat.

C

HERPES.

\* Vid. Clinical Experiments.

## H E R P E S.

## CHARACTER.

Phlyctænae vel ulcuscula plurima, gregalia, serpentina, dysepuleta.

Ineunte vere, ut plurimum, sine ulla jactura incipit morbus ; maculae prurientes, nunc albae nunc rubrae, in aliqua corporis parte erumpunt, quae postea per totum fere corpus serpunt. Tandem hae inter se conjunctae speciem macularum latarum admodum rubrarum exhibent, e quibus saepissime fluidum serosum extillat. Maculae distinctae aequae ac aggregatae in squamulas furfurosas abeunt, cutem rubram relinquentes. His discedentibus, novae maculae, eundem cursum tenentes, et a nova serie excipiendae, erumpunt.

punt. Hoc modo morbus perstat, donec arte sanetur; aut sponte remittat, quod, ingruente hyeme, plerumque fit; ineunte autem vere, iterum erupturus. Raro hic morbus sine medicamentorum ope sublatus est, nihilo minus per totum fere vitae cursum durare potest, salva adhuc sanitate.

## DIAGNOSIS.

Mulieres huic morbo sunt maxime obnoxiae, lepra fere sunt immunes. In herpete, maculae sunt plerumque rubrae et pruriunt, sensibilitate cutis manente. In lepra, maculae subflavae, subalbidae, vel subnigrae sunt, cum cutis insensibilitate, vicinis solummodo prurientibus. Herpes in squamulas furfurosas abit, quas alia macularum series exceptura est. Lepra in squamulas admodum latas abit; eas tamen nul-  
lae

lae maculae excipiunt ; sed exudatio fit, et crustae, ut priores, discessurae, gignuntur. Herpes, ingruente hyeme, remittit, lepra nunquam, sed ad alia pejora stadia ruit.

Herpes saepe, veteribus ulceribus sanatis, symptomaticus apparet ; lepra nunquam : Herpes rarissime, si unquam, contagiosus est ; lepra semper. Herpes est merus cutis morbus, et per totum fere vitae cursum durare potest, sanitate integra manente. Lepra incipiens, cutem, sed progrediens, totum systema afficit, et saepe post quatuor vel quinque annos est lethalis. Herpes in regionibus frigidis ; lepra autem in calidis grassatur. E psora distinguitur pustulis exiguis prurientibus, acri sero turgidis, lentis aut grani milii fere magnitudine, manus praecipue infestantibus ; a gutta rosea, per desquamationem hanc nequaquam comitantem.

CAUSÆ

## CAUSÆ REMOTÆ.

Ægri hoc morbo vexati originem ejus præcipue causis debilitantibus tribuunt, imprimis, cibo parum nutrimenti præbenti, exercitationi neglectæ, humiditati. Hinc de medicina scribentes haud sine ratione causam remotam vasorum extremorum debilitati assignarunt. Huic opinioni favet remissio, quam, ingruente hyeme, morbus subiit, frigore vasa extrema corroborante, et medicamenta, quæ in hocce morbo maxime profunt, sunt stimulantia.

## CAUSÆ EXCITANTES

Stimulantia præcipue sunt, ut plane constat in herpete collari Sauvagesii, qui e vestimentorum ecclesiasticorum frictione  
ori-



oritur, et in herpete periscele, qui poplite, ubi periscelis vinciri solet, infestat.

## CONSILIA MEDENDI

Duo sunt : Primo, statui cutis morboſo occurrere. Secundo, ne redeat, cavere.

Ad quorum prius, medicamenta externa; ad posterius, interna, sunt referenda. Quando autem morbus solum in una corporis parte, sub speciem macularum siccarum et parum confluentium apparet, solummodo necessarium erit mercurii praeparationes vel unguentum vitriolicum adhibere : Ut  
℞ Axungiae porcin. ℥ii. merc. praecip. rub. ℥ii. m. pro unguento; vel axungiae ℥ii. acidi vitriolici ℥ii. m. Quin, cum morbus inveteraverit, et maculae latae inter se confluentes per totum corpus diffusae sint, et ex illis serum acre extillet, medicamenta interna et evacuantia adhiberi debent : Ut  
fal.

fal. Glaub. fal. polychrest. aquae minerales purgantes, ut Harrowgate, Cheltenham, pil. Plumeri, solutio mercurii sublimati, ut merc. corros. sub gr. ii. fal. ammoniaci gr. xv. solve in aq. font. ℥viii. cap. ℥ss. 4ter in die. Julapium vitriolicum, R. acidi vitriolici ℥i. aq. font. ℥iss. syr. simp. In tali casu, si solum medicamenta topica adhibita forent, in summo periculo versaretur aegrotus, non acri quodam in systema repulso, sed libramine circuitus mutato. Idem malum saepissime fit, cum vetera ulcera sanentur; vel fonticuli, aut alia solita evacuatio, sistatur. Cum maculae inflammatae sunt, solutio sacch. Saturn. feliciter saepe applicari potest\*. Alia medicamenta, quae nonnullis laudantur, sunt oenanthe crocata, gallium aparine, nitrum, balneum calidum; hoc praecipue, quod vi stimulante gaudeat, et cutim e fordibus purget, uti aegrum oportet.

## P S O R A.

\* Amicus ingeniosus me certiore fecit, se in Nosocomio Dublinensi observasse oleum sinapi in herpete externe feliciter adhibitum.

## P S O R A.

## CHARACTER.

Pustulae et ulcuscula pruriginosa, contagiosa, manus male habens.

Hic morbus in digitis incipit pustulis exiguis, acri sero plenis, lentis aut grani milii fere magnitudine, quae scalpendo rumpuntur, et dein crustosae insigniter prurientes evadunt. Hic affectus a contagio sui generis oritur; et fordidis et montium incolis maxime familiaris est.

## CONSILIA MEDENDI

Duo sunt: Materiam morbificam evacuare, aut effectibus obviam ire. Medicamenta interna sunt, flor. sulphuris, mistura vitriolica, ut in herpete praescripta.

Medicamenta externa, unguentum e sulphure pharm. Londinensis, unguenta e mercurio et ex acido vitriolico, ut in herpete; solutio sacchar. Saturni.

## F I N I S.